

Florovit hnojivo proti hnednutiu ihličia



Najčastejšou príčinou úhynu ihličnatých stromov je nedostatok živín. Po určitom čase po výsadbe sa farba ihličia zmení na svetlozelenú, potom žltú a nakoniec ihličie zhnedne a opadne a strom odumrie. Popísané príznaky nie sú spôsobené škodcami. Ide o následky nesprávneho prísunu živín – najčastejšie je nedostatok horčíka. Pretože absorpcia živín z pôdy v suchej pôde výrazne klesá, opísané symptómy nedostatku sú najčastejšie viditeľné v obdobiach sucha. Týmto nedostatkom sa dá predchádzať zásobovaním stromov horčíkom, a to ako hnojením pôdy, tak kŕmením listov.

Ako používať:

Odporúčanú dávku hnojiva rovnomerne nasypete pod korunu stromov alebo kríkov. Potom treba rastliny hojne zalievať. Hnojivo je možné podľa potreby používať celoročne. Hnojivo je vhodné použiť najmä vtedy, keď sa objavia prvé príznaky hnednutia ihličia. Hnojivo je možné použiť aj vo forme postrekov na list. Na toto ošetrenie sa odporúča približne 5% roztok hnojiva (500 g hnojiva na 10 litrov vody). V prípade silného nedostatku je potrebné túto kúru opakovať 2-3 krát v 14-dňových intervaloch.

Veľkosť stromu alebo kríka

do 1 m
od 1 m do 2 m
od 2 m do 5 m
od 5 m do 10 m
nad 10 m

Odporúčaná dávka

25 g/ m²
50 g/ m²
100 g/ m²
150 g/ m²
200 g/ m²

Hnojivo sa odporúča aj pre všetky rastliny ohrozené nedostatkom horčíka.

Predvegetácia: jednorazovú dávku 25 g/m² pestovateľskej plochy zmiešame s minimálne 10-centimetrovou vrstvou zeminy.

Prikrývka: jednorazová dávka 10 g/m^2 pestovateľskej plochy sa aplikuje ako postrek alebo listová aplikácia, postrekom rastlín 5% roztokom s použitím 50-100 ml pracovnej tekutiny na 1 m^2 pestovateľskej plochy .

Jedna polievková lyžica obsahuje v priemere 15 g hnojiva.

Dátum aplikácie:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Zloženie hnojiva:

ES HNOJIVO Typ hnojiva - síran horečnatý.

16,0 % (MgO) vo vode rozpustný oxid horečnatý; 32,0 % (SO₃) oxid sírový rozpustný vo vode